



Adesivo per l'identificazione
dell'alunno/a

INCOLLARE
ATTENTAMENTE

FISICA

Formule

FIZ T D



FIZ.06.IT.R.T1.08



12



Fisica

Elenco delle formule e delle costanti

Cinematica

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$s = v_0 t \pm a \frac{t^2}{2}$$

$$v = v_0 \pm at$$

$$v^2 = v_0^2 \pm 2as$$

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

Dinamica

$$F = ma$$

$$F_{tr} = \mu F_p$$

$$F_{elas} = -kx$$

$$p = mv$$

$$F\Delta t = \Delta p$$

$$W = \Delta E$$

$$W = Fs \cos \alpha$$

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

$$\Delta E_{gp} = mg\Delta h$$

$$E_{ep} = k \frac{x^2}{2}$$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$F_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Idromeccanica

$$p = \frac{F}{S}$$

$$p = \rho gh$$

$$F_u = \rho g V$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

FIZ T D



99

Fisica

Termodinamica

$$n = \frac{N}{N_A}$$

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT$$

$$pV = nRT$$

$$l = l_0 (1 + \alpha \Delta t)$$

$$Q = mc\Delta t$$

$$Q_t = m\lambda$$

$$Q_i = mr$$

$$\Delta U = Q \pm W$$

$$W = p\Delta V$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Elettricit  e magnetismo

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}$$

$$F = qE$$

$$W = qU$$

$$U = Ed$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$

$$W = \frac{CU^2}{2}$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$I = \frac{E}{R_u + R_v}$$

$$P = UI$$

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2r\pi}$$

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{l}$$

$$F = BIl \sin \alpha$$

$$F_L = qvB \sin \alpha$$

$$\Phi = BS \cos \alpha$$

$$U_i = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$U_i = -Blv \sin \alpha$$

$$I = \frac{U}{Z}$$

$$R_L = L\omega$$

$$R_C = \frac{1}{C\omega}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}$$

FIZ T D



99

Fisica

Oscillazioni e onde

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$x = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$v = v_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$v_0 = \frac{2\pi A}{T}$$

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

$$a = -a_0 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$a_0 = \frac{4\pi^2 A}{T^2}$$

$$y = A \sin\left(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

Ottica

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

$$n = \frac{c}{v}$$

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\lambda = \frac{sd}{a}$$

$$d \sin \alpha_k = k\lambda$$

$$\operatorname{tg} u_B = n$$

Fisica moderna

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$P = \sigma ST^4$$

$$\lambda_{\max} T = b = \text{konst.}$$

$$E = hf$$

$$\frac{m_e v_{\max}^2}{2} = hf - W_i$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$E_V = \Delta mc^2$$

$$N = N_0 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 e^{-\lambda t} \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T}$$

FIZ T D



99

Fisica

Costanti

costante gravitazionale	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N kg}^{-2} \text{ m}^2$
accelerazione della caduta libera sulla superficie terrestre	$g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ (prendere 10 m s^{-2})
massa della Terra	$M = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
raggio terrestre	$R = 6370 \text{ km}$
massa atomica unificata	$u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
costante di Avogadro	$N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
costante universale di un gas	$R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
velocita' della luce nel vuoto	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$
carica elementare	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
massa dell'elettrone	$m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
massa del protone	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
costante dielettrica nel vuoto	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$
permeabilit� nel vuoto	$\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$
costante di Boltzmann	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
costante di Planck	$h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
costante di Stefan-Boltzmann	$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$
costante di Wien	$b = 2,89 \cdot 10^{-3} \text{ K m}$

FIZ T D





Fisica

Pagina vuota

FIZ T D



99





Fisica

Pagina vuota

FIZ T D



99





Fisica

Pagina vuota

FIZ T D



99