



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

Identifikacijska
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPITI

KEM

KEMIJA Ispitna knjižica 2

KEM IK-2 D-S031

KEM.31.HR.R.K2.24



30329



12

Kemija

Prazna Stranica

KEM IK-2 D-S031



99

OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **180** minuta bez stanke.

Zadatci su u dvjema ispitnim knjižicama. Redoslijed rješavanja birajte sami.

Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli riješiti sve zadatke.

U ovoj ispitnoj knjižici rješavate zadatke uz prikazani postupak.

Ispred svake skupine zadataka je uputa za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Olovku i guminu možete upotrebljavati samo za crtanje grafa.

Možete upotrebljavati priloženi periodni sustav elemenata, tablicu temeljnih prirodnih konstanti i standardnih redukcijskih elektrodnih potencijala.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova. Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis. **Zabranjeno je potpisati se punim imenom i prezimenom.**

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 24 stranice, od toga 3 prazne.

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

a) zadatak zatvorenoga tipa

Ispravno

A	X	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>
---	---	---	--------------------------	---	--------------------------

Ispravak pogrešnoga unosa

A		B	<input type="checkbox"/>	C	X	C	
---	--	---	--------------------------	---	---	---	--

Neispravno

A	<input type="checkbox"/>	B	X	c	O
---	--------------------------	---	---	---	---

Prepisan točan odgovor

Skraćeni potpis

b) zadatak otvorenoga tipa

(Marko Marulić)

Petar Preradović



↑
Precrtan netočan odgovor u zagradama

↑
Točan odgovor

↑
Skraćeni potpis



Kemija

II. Zadatci kratkoga odgovora, zadatci dopunjavanja i zadatci produženoga odgovora


U sljedećim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom ili dopunite rečenicu/tablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje. U zadatcima s računanjem potrebno je prikazati i postupak s ispravnim mjernim jedinicama.

Odgovore upišite **samo** na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižici.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

1. Riješite zadatke vezane uz nazivlje spojeva.

- 1.1. Napišite kemijski naziv prikazanoga spoja.



Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	

- 1.2. Napišite kemijsku formulu magnezijeva nitrata.

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	


2. Izведен je pokus raspada saharoze na glukozu i fruktozu u kiselim uvjetima pri temperaturi $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Svakih 5 minuta tijekom raspada određena je množinska koncentracija saharoze u reakcijskoj smjesi.
Rezultati su prikazani u tablici.

t/min	$c(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}) / \text{mol dm}^{-3}$
0	0,80
5	0,40
10	0,24
20	0,20
30	0,20



Kemija

- 2.1. Nacrtajte dijagram ovisnosti koncentracije saharoze o vremenu reakcije.



- 2.2. Kako povećanje početne koncentracije saharoze utječe na brzinu opisane reakcije?

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	bod
0	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	bod
0	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	bod
0	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	bod

- 2.3. Izračunajte ukupnu masu nastale glukoze i fruktoze u dvadesetoj minuti opisane reakcije. Volumen reakcijske smjese iznosi 10 mL.

Postupak:

Odgovor: $m(\text{glukoza} + \text{fruktoza}) = \underline{\hspace{2cm}}$ g


- 2.4. Na dijagramu **skicirajte** kako bi se mijenjala koncentracija saharoze pri raspadu na temperaturi višoj od $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Označite krivulju na dijagramu koja odgovara temperaturi višoj od $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Kemija

3. Reakcijom klorovodične kiseline i kalcijeva karbonata u uređaju prikazanome na slici nastaje plinoviti produkt.



- 3.1. Kako se naziva dio uređaja koji je na slici označen slovom **A**?

Odgovor: _____

- 3.2. Nacrtajte Lewisovom simbolikom plinoviti produkt koji nastaje opisanom reakcijom.

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	

- 3.3. Kalcijev karbonat se u prirodi pojavljuje u dvama kristalnim oblicima, kao mineral kalcit i kao mineral aragonit. Ta se dva minerala ne razlikuju po kemijskom sastavu nego po kristalnoj strukturi. Kako se naziva ta pojava?

Odgovor: _____



Kemija

- 3.4.** Gustoća klorovodične kiseline iznosi $1,088 \text{ g/L}$.
Izrazite njezinu gustoću u g cm^{-3} .

Postupak:


Odgovor: _____ g cm^{-3}

0	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>
bod	




Kemija

4. Ionizacija vode može se prikazati ravnotežnom jednadžbom kemijske reakcije




Na dijagramu su prikazane vrijednosti ravnotežnih konstanta ionizacije vode pri različitim temperaturama.



- 4.1. S dijagrama očitajte vrijednost ravnotežne konstante ionskoga produkta vode pri 15 °C.

Odgovor: $K_w = \underline{\hspace{2cm}}$ mol² dm⁻⁶

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

- 4.2.** Napišite izraz za ravnotežnu konstantu ionizacije vode na temelju jednadžbe kemijske reakcije.

Odgovor: _____

- 4.3.** Ravnotežna konstanta ionizacije vode pri $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ iznosi $2,3 \times 10^{-14}\text{ mol}^2\text{ dm}^{-6}$. Koliko iznosi pH-vrijednost čiste vode pri $40\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Postupak:

Odgovor: pH = _____

- 4.4.** Koliki je omjer množinskih koncentracija hidroksidnih i oksonijevih iona u čistoj vodi pri $25\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

5. Pokusima su ispitana svojstva propan-2-ola. Propan-2-ol je tekućina koja gori i dobro se miješa s vodom.

- 5.1. Koliki je oksidacijski broj središnjega atoma ugljika u propan-2-olu?

Odgovor: _____

- 5.2. Jednadžbom kemijske reakcije prikažite gorenje propan-2-ola uz dovoljan pristup kisika.

Odgovor: _____

- 5.3. Koliko je vrelište vodene otopine u kojoj je maseni udio propan-2-ola 10 %?

$$(K_b(\text{H}_2\text{O}) = 0,51 \text{ K kg mol}^{-1})$$

Postupak:


Odgovor: $t_v = \underline{\hspace{2cm}}$ °C

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

6. Na slici je prikazan pokus u kojem zagrijavanjem natrijeva hidrogenkarbonata nastaju natrijev karbonat, ugljikov(IV) oksid i voda.



- 6.1. Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja se odvija u prikazanome pokusu.

Odgovor: _____

- 6.2. Nastanak kojega spoja dovodi do zamućenja bistre vapnene vode tijekom uvođenja ugljikova(IV) oksida u prikazanu epruvetu?

Odgovor: _____

- 6.3. Zašto se zapaljena šibica ugasi kada se unese u posudu napunjenu ugljikovim(IV) oksidom?

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

7. Dodatkom vodene otopine srebrova nitrata u uzorak vodovodne vode nastaju koloidne čestice teško topljivoga srebrova klorida koje uzrokuju bijelo zamućenje.
- 7.1. Napišite jednadžbu kemijske reakcije nastajanja bijelog zamućenja i označite agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

Odgovor: _____

- 7.2. Toplivost srebrova klorida u vodi određena je ravnotežnom konstantom otapanja $K_s = c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Cl}^-)$ koja pri 25°C iznosi $1,8 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$. Kolika je množinska koncentracija otopljenoga srebrova klorida u zasićenoj otopini pri 25°C ?

Postupak:

Odgovor: _____

- 7.3. Kako dodatak natrijeva klorida utječe na količinu taloga srebrova klorida koji je u ravnoteži sa zasićenom otopinom srebrova klorida?


Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

8. Dijagram prikazuje promjenu energije tijekom kemijske reakcije $A(g) + B(s) \rightarrow C(g)$.



8.1. Na dijagramu označite energiju aktivacije.

8.2. Kako će povećanje veličine granula reaktanta **B** utjecati na brzinu kemijske reakcije?

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	
bod		
0	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	
bod		

Kemija

- 9.** Kation zemnoalkalijskoga metala koji oboji plamen u zeleno dokazujemo razrijeđenom sumpornom kiselinom pri čemu nastaje teško topljivi talog bijele boje.

- 9.1.** Jednadžbom kemijske reakcije prikažite dokazivanje toga kationa sa sumpornom kiselinom i označite agregacijska stanja.

Odgovor: _____

- 9.2.** Izračunajte broj sumporovih atoma u 1 L otopine sumporne kiseline množinske koncentracije $0,1 \text{ mol dm}^{-3}$.

Postupak:


Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

10. Zadane su standardne entalpije sagorijevanja etena, grafita i vodika:



10.1. Izračunajte standardnu reakcijsku entalpiju za reakciju nastajanja plinovitoga etena $2 \text{C(s)} + 2 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$.

Postupak:

Odgovor: $\Delta_f H^\circ[\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})] = \underline{\hspace{10cm}}$ J mol⁻¹

10.2. Nacrtajte entalpijski dijagram za reakciju sagorijevanja grafita.

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	




Kemija

11. Promjena koja se odvija u **zatvorenoj**, ali **neizoliranoj** reakcijskoj posudi stavnoga volumena prikazana je jednadžbom kemijske reakcije $3 \text{ A} + \text{B} \rightleftharpoons 2 \text{ C}$ $\Delta_r H < 0$.

- 11.1. Nacrtajte dijagram ovisnosti množinskih koncentracija svih sudionika kemijske reakcije o vremenu:

- tako da su početne koncentracije reaktanata **A** i **B** jednake i iznose 4 mmol L^{-1} , a početna koncentracija produkta **C** jednaka je nuli
- tako da sustav doseže ravnotežno stanje 15 minuta nakon početka reakcije
- tako da ravnotežna koncentracija produkta **C** iznosi 2 mmol L^{-1} .

Na svakoj krivulji obvezatno naznačite na kojega se sudionika reakcije odnosi.



0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	

- 11.2. Opišite **izmjenu tvari i energije** između reakcijske posude i okoline tijekom opisane promjene.

Odgovor: _____



Kemija

12. Ako se u jodnu vodu uvede eten, ona postane bezbojna.

12.1. Jednadžbom kemijske reakcije prikažite opisanu kemijsku reakciju.

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	

12.2. Kojoj vrsti organskih kemijskih reakcija pripada reakcija etena i jodne vode?

Odgovor: _____

13. Zasićena otopina kalijeva nitrata pri 25°C pripremljena je otapanjem 56 g kalijeva nitrata u 144 g vode.

13.1. Kolika je topljivost kalijeva nitrata pri 25°C iskazana masenim udjelom?

Postupak:

Odgovor: $w_{\text{sat}}(\text{KNO}_3) = \underline{\hspace{2cm}}$

13.2. Topljivost kalijeva nitrata u vodi pri 10°C iznosi 19 %. Koliko se kalijeva nitrata izluči iz 200 g zasićene otopine hlađenjem s 25°C na 10°C ?

Postupak:


Odgovor: $m(\text{KNO}_3) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

14. Reakcija aluminija i klorovodične kiseline prikazana je jednadžbom



- 14.1. Koliko grama aluminijeva klorida nastaje u potpunoj reakciji 1,5 g aluminija i klorovodične kiseline u suvišku?

Postupak:

Odgovor: $m(\text{AlCl}_3) = \underline{\hspace{2cm}}$ g

- 14.2. Koliko je iskorištenje reakcije u kojoj je pri izvođenju pokusa dobiveno 9,26 g aluminijeva klorida, a teoretski je tom reakcijom moglo nastati 9,85 g aluminijeva klorida?

Postupak:

Odgovor: $\eta = \underline{\hspace{2cm}} \%$

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

15. U tablici su navedene mase amonijeva klorida koji se može otopiti pri određenoj temperaturi u 100 g vode.

$t / ^\circ\text{C}$	m (amonijeva klorida) / g
0	28
10	33
30	41
50	50
70	60
90	71

- 15.1. Koristeći se zadanim podatcima prikažite krivulju topljivosti amonijeva klorida i označite osi.




- 15.2. Prikazite Lewisovom simbolikom ione amonijeva klorida.

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

16. Reakcija natrijeva hidrida s vodom prikazana je jednadžbom kemijske reakcije



- 16.1. Koliki se volumen vodika razvije pri temperaturi 25 °C i tlaku 100 kPa reakcijom vode i 12,2 g natrijeva hidrida?

Postupak:

Odgovor: $V(\text{H}_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ dm³

- 16.2. Natrijev hidrid može se pripremiti izravnom reakcijom vodika i tekućega natrija. Napišite jednadžbu te kemijske reakcije i označite agregacijska stanja.

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>
bod	



Kemija

17. Razrijeđena vodena otopina vodikova peroksida volumnoga udjela 9 % upotrebljava se za izbjeljivanje kose, a priprema se iz koncentrirane otopine u kojoj je volumni udio vodikova peroksida 30 %.

- 17.1. Izračunajte volumen vode potreban za pripremu 100 mL razrijeđene otopine iz koncentrirane otopine vodikova peroksida.

Postupak:

Odgovor: _____

- 17.2. Koje se odmjerno posuđe upotrebljava za razrjeđivanje vodene otopine vodikova peroksida?

Odgovor: _____


0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>
bod	



Kemija

18. Izveden je pokus miješanjem otopine koja sadržava 0,20 g kalijeva sulfata i otopine koja sadržava 0,20 g olovova(II) nitrata.

Kemijska promjena iz pokusa prikazana je jednadžbom kemijske reakcije



- 18.1. Koja je tvar u opisanome pokusu mjerodavni reaktant?

Postupak:

Odgovor: _____

- 18.2. Kolika je množinska koncentracija kalijevih iona u nastaloj otopini ako je volumen otopine 200 mL?

Postupak:

Odgovor: $c(\text{K}^+) = \underline{\hspace{2cm}}$ mol/L

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	
0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
bod	



Kemija

Prazna Stranica

KEM IK-2 D-S031



99

Kemija

Prazna Stranica

KEM IK-2 D-S031



99